



Wilhelmsburger (Synonyme: Holsteiner Perle, Perle von Holstein)

Kategorien	Hohe Sorte						
Züchter/-in							
Historische Beschreibung	Die Sorte wurde erstmalig 1928 genannt und war von 1948 – 1966 auf DDR-Gebiet und von 1949 bis 1995 in der BRD zugelassen. Die ist geeignet für die Frühernte im September und Oktober. Die Aussaat erfolgt Ende Mai bei einer Entwicklungszeit von 126 – 140 Tagen zwischen Pflanzung und Ernte. Die Sorte ist im Hamburger Anbaugebiet beliebt, erfordert gute Böden und besitzt eine geringe Frosthärte – Wuchs hoch und mittelbreit – Das Umblatt ist mittelgroß bis groß, etwas breitrund, ziemlich zahlreich, Blattstellung zunächst waagrecht, später etwas hängend. Die Farbe ist gelblichgrün, die Blattfläche etwas blasig aufgetrieben, am Blattrand schwach bis mittelstark aufgebogen. Der Blattstiel ist mittellang, die Rotadrigkeit tritt nicht auf – Rosen: mitteldicht bis dicht gestellt, länglich und ziemlich groß, ziemlich fest. Die äußeren Blätter sind jedoch meist nicht geschlossen. Die Rosenentwicklung tritt vergleichsweise früh ein. – Die äußeren Rosenblätter liegen i.d.R. nicht fest an, weshalb die Rosen geputzt werden müssen Quellen: Mappes (1940), Wirth (1948), Bitterhoff (1929), Hahn (1953), Schmitz (1941)						
Anzahl Sorteneinträge (Datenbank)	<table> <tr> <td>Zeitraum der Literatureinträge</td><td>1928</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Einträge (Handel)</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Einträge (Fachliteratur)</td><td>15</td></tr> </table>	Zeitraum der Literatureinträge	1928	Anzahl der Einträge (Handel)	6	Anzahl der Einträge (Fachliteratur)	15
Zeitraum der Literatureinträge	1928						
Anzahl der Einträge (Handel)	6						
Anzahl der Einträge (Fachliteratur)	15						
Sortenliste	Zulassung: 1948 (sowj. Besatzungszone) / 1949 (Vereinigtes Wirtschaftsgebiet) Löschung: 1995, 1966 (DDR)						
Herkünfte	DEU146 BRA 315 'Wilhelmsburger' DEU146 BRA 2045 'Wilhelmsburger' DEU146 BRA 2882 'Wilhelmsburger' GBR006 HRIGRU 605 'Wilhelmsburger' GBR006 HRIGRU 2200 'Wilhelmsburger' (kein Aufgang) GBR006 HRIGRU 2201 'Wilhelmsburger Hanseat' (kein Aufgang) SWE054 NGB1981 'Wilhelmsburger' → positiv bewertet NLD037 CGN7003 'Wilhelmsburger'						

Historische Abbildungen



Kampe et al. (1956)



Hahn & Schmidt (1951)

Sortensteckbriefe – ZENPGR – 2019

Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019	DEU146 BRA 315 'Wilhelmsburger' (negativ bewertet)	DEU146 BRA 2045 'Wilhelmsburger' (negativ bewertet)	DEU146 BRA 2882 'Wilhelmsburger' (negativ bewertet)
Pflanzenhöhe	mittel bis hoch (6) z.T. mittel (5) und hoch (7)	mittel bis hoch (6) z.T. niedrig bis mittel (4)	mittel bis hoch (6)
Knospendichte bei Erntereife	dicht (7)	dicht (7)	mittel bis dicht (6)
Abstand zwischen den Knospen	mittel (5)	mittel (5)	mittel (5)
Sprossprofil einschl. der Knospen	zylindrisch (3)	kegelförmig bis zylindrisch (2)	kegelförmig bis zylindrisch (2)
Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel (4)	früh (3)	früh (3)
... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage			
Einschätzung Feldtag	sehr kleine Röschen, heterogen, keine Verzweigungen	besserer Zustand, lässt auf Bearbeitung zurückschließen	sehr heterogen, sieht ungesund aus
	GBR006 HRIGRU 605 'Wilhelmsburger' (negativ bewertet)	SWE054 NGB1981 'Wilhelmsburger' (positiv bewertet)	NLD037 CGN7003 'Wilhelmsburger' (negativ bewertet)
Pflanzenhöhe	mittel bis hoch (6) z.T. niedrig bis mittel (4), hoch (7)	mittel bis hoch (6) z.T. mittel (5)	mittel bis hoch (6) z.T. hoch (7)
Knospendichte bei Erntereife	mittel bis dicht (6)	mittel bis dicht (6)	mittel (5)
Abstand zwischen den Knospen	gering bis mittel (4)	mittel (5)	mittel (5)
Sprossprofil einschl. der Knospen	zylindrisch (3) z.T. kegelförmig (1)	kegelförmig (1)	zylindrisch (3) z.T. kegelförmig bis zylindrisch (2)
Zeitpunkt der Erntereife	früh (3)	früh (3)	früh (3)
... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage			
Einschätzung Feldtag	langgezogenere Röschen	brauchbarer Zustand, ca. 50 % zeigen einen annehmbaren Röschenansatz. Es sind Typen zu beobachten, bei denen die Röschen gleichzeitig reifen und Typen, bei denen die Röschen nach und nach abreifen	heterogen, häufig mit Verzweigungen, 1 Schosser

Abbildungen Sichtung 2019 - SWE054 NGB1981 'Wilhelmsburger'



Fotos: BSA 23.09.2019