

Ulmer niedriger

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Kategorie | Frühwirsing | |
| Züchter-/in | | |
| Historische Beschreibung | <p>Ulmer Frühwirsinge werden bereits seit 1836 vielfach in Gemüsekatalogen angeboten (Grashoff 1836, Brückner 1836). Seit Mitte der 1930er Jahre wurde sie durch andere Frühsorten abgelöst. Sie eignet sich für frühe und späte Aussaaten (bis Ende Juni) und haben eine mittelfrühe Reifezeit. Im Herbst geerntete Köpfe lassen sich auffallend gut überwintern. Sie eignen sich für schweren Boden, wo sie größere Köpfe bilden. Der Pflanzabstand beträgt 50 x 40 cm. Die Köpfe sind niedrig und klein (Müllers & Wehrhahn ca. 1935) Die Blätter sind grün bis dunkelgrün, sehr bis mäßig gekraust und fein. Die Rippen sind fast verschwunden.</p> <p>Quellen: Becker-Dillingen (1929), Gressent (1905), Jaensch (1910)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sieht einem Krautkopf ähnlich (glatt) und platzt leicht. – Strunk hoch, bis über die Mitte des Kopfes emporragend, spitz, mit langen Stengelgliedern, unten blattlos. – Freiblätter stark aufgerichtet, erscheinen weißlich, Kopfdeckblätter weniger hell – Kopf platt, groß – Zum Überwintern für den Herbstanbau (Mitte November). Entwicklungszeit 110-115 Tage. – Pflanzweite 60-70 cm – Durchschnittsertrag 200 dz/ha <p>Quellen: Becker-Dillingen (1924), Heinemann (1909), Heinemann (1896), Späth (1930)</p> | |
| Anzahl Sorteneinträge (Datenbank) | Zeitraum der Literatureinträge Anzahl der Einträge (Handel) Anzahl der Einträge (Fachliteratur) | 1836 – 1935 49 12 |
| Sortenliste | nie | |
| Herkünfte | GBR 006 HRIGRU 3654 'Dwarf Ulm' → kein Aufgang SWE054 NGB 6040 'Ulmer' | |

Historische Abbildungen



Sortensteckbriefe – ZENPGR – 2019

| Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019 | | SWE054 NGB 6040 'Ulmer' (positiv bewertet) |
|---|---|--|
| Pflanze | maximaler Durchmesser (einschließlich Umblätter) | mittel (5) |
| | Länge des Außenstrunks | kurz bis mittel (4) |
| Kopf | Durchmesser | klein (3) z.T. sehr klein bis klein (2) und klein bis mittel (4) |
| | Schluss | teilweise gedeckt (2) |
| | Dichte | mittel bis dicht (6) |
| | Länge des Innenstrunks im Verhältnis zur Länge des Kopfes | mittel (5) |
| Zeitpunkt | der Erntereife | früh mittel (4) |
| | des Platzes des Kopfes nach der Reife | mittel bis spät (6) |
| | | ... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage |
| Zusätzliche Bemerkungen (BSA) | Partie sehr inhomogen, aber schöne dunkelgrüne Farbe der Umblätter | |
| Einschätzung Feldtag | Kopf klein, niedrig, schönes dunkelgrünes Blatt (sticht farblich heraus - die dunkelste Sorte in der Sichtung) | |
| Abbildungen Sichtung Akz. 2019 |    | |
| Pflanzung 07.05.2019 | <p>Foto: BSA 09.07.2019</p> <p>Fotos: BSA 15.07.2019</p> | |