

Znaimer

Anbau	Freilandgurke	
Verarbeitung		
Farbe b. Sa.-reife		
Typ		
Züchter_in	Franz Frimel von Traisenau, Eisgrub (Ö)	
Historische Beschreibung	<p>„sind der vorigen [Liegnitzer] ähnliche Lokalsorten. Gegen Mehltau oft sehr empfindlich. Alteingeführte böhmische Landsorte.“ (Becker-Dillingen 1924)</p> <p>„wegen des fast gleichzeitigen Erscheinens von männl. und weibl. Blüten früher erntbar als die Ausgangssorte“ (Röbbelen 2000)</p> <p>„bedingt zugelassen (Lokalsorte)“ (Reichsnährstand 1942)</p>	
Datenbankeinträge (,Hist. genutztes Gemüse‘)	Zeitraum der erfassten Literatureinträge	1924 - 1942
	Anzahl der Literatureinträge in Katalogen, Preisverzeichnissen etc.	
	Anzahl der Literatureinträge in Fachliteratur	6
Zugelassen von-bis	Sortenliste vor 1945:	
	Sortenliste DDR:	
	Sortenliste BRD:	
Herkünfte	<p>BGR001 1983-CUC-SA-109 ELSGRUBER ZNAINER</p> <p>BGR001 1996-CUC-SA-21 ZNOJEMSKA NAKLAD</p> <p>CZE122 09H3900748 Znojemske Nakladacky</p> <p>NLD037 CGN20222 Znojemske Nakladacky,PI283902</p> <p>AUT047 HBLFAG-Cuc-0004 Znojmia</p> <p>DEU146 CUS 143 Znojmia</p> <p>AUT046 ARCHE-GU039 Znojmia</p> <p>CZE122 09H3900006 Znojmia,Palava</p>	

BSA – Sichtungsanbau – Znaimer

Prüfnummer BSA	125	126	127
Bezeichnung	CZE122 09H3900748 Znojemske Nakladacky	DEU146 CUS 143 Znojmia	CZE122 09H3900006 Znojmia,Palava
Pflanze: Gesamtlänge der ersten 15 Internodien	mittel bis lang (6)	mittel bis lang (6)	mittel bis lang (6)
Zeitpunkt der Bildung weiblicher Blüten (80% der Pflanzen mit mindestens einer weiblichen Blüte)	mittel bis spät (6)	mittel (5)	mittel bis spät (6)
Anzahl weiblicher Blüten je Knoten	vorw. 1 oder 2 (2)	vorw. 1 oder 2 (2)	? (?)
Fruchtgröße	Länge	kurz bis mittel (4)	kurz bis mittel (4)
	Durchmesser	mittel (5)	mittel bis groß (6)
	Verhältnis Kernhaus- zu Fruchtdurchmesser	mittel bis groß (6)	mittel bis groß (6)
Fruchtform	im Querschnitt	winklig (3)	winklig (3)
	Kelchende	stumpf (2)	stumpf (2)
	Stielende	stumpf (3)	stumpf (3)
	Länge des Stieles	kurz bis mittel (4)	mittel (5)
Grundfarbe der Epidermis	zum Zeitpunkt der Marktreife	grün (3)	grün (3)
	Farbintensität	mittel (5)	mittel (5)
	Zum Zeitpunkt der physiologischen Reife	orange (4)	orange (4)
Gesamtbewertung	+ guter Blütenansatz und allgemein guter Zustand. Typ. Essigurke. Guter, süßer Geschmack. Alte böhmische Landsorte.	+ guter Blütenansatz, z.T. subgynözisch und allgemein guter Zustand. Typ. Essigurke. Guter, süßer Geschmack. Alte böhmische Landsorte.	+ guter Blütenansatz, aber späterer Blühbeginn. Allgemein guter Zustand. Typ. Essigurke. Guter, süßer Geschmack. Alte böhmische Landsorte.



BSA. 04.08.2020